改　　正　　後

別表第３　可消化養分総量及び代謝エネルギー

原　料　名	畜種	栄養価（原物中） DM (%)	TDN (%)	ME (Kcal/kg)	消化率 粗たん白質	粗脂肪	可溶無窒素物	粗繊維	代謝率	備　　考
（略）										
３．植物性油かす類 （植物性油料原料から搾油したかす類又は植物性たん白質を主成分とするものをいう。）										
油ヤシ空果房抽出物	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
油ヤシ搾油副産物	鶏 豚 牛	95.3 — —	— — —	2,920 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	48.3 — —	油ヤシ空果房を発生後速やかに搾油して得られた油及びパーム油搾油で発生するソリュブルを油ヤシ果実繊維に吸着させ乾燥したものであって、粗脂肪含量がおおむね40%、粗繊維含量がおおむね12%のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
加糖加熱処理大豆油かす	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
加糖加熱処理大豆油かす	鶏 豚 牛	— — 89.0	— — 80.4	— — —	— — 93	— — 76	— — 96	— — 99	— — —	大豆油かすに1.5～2.0%のビートシロップを加え、90～105℃で20～45分間加熱処理したものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
加糖加圧蒸煮処理大豆油かす	鶏 豚 牛	— — 91.5	— — 81.6	— — —	— — 92	— — 58	— — 99	— — 93	— — —	大豆油かすに0.5～2.0%のぶどう糖を加え、120～140℃で５～30分間加圧缶内で蒸煮処理したものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

改　　正　　前

別表第３　可消化養分総量及び代謝エネルギー

原　料　名	畜種	栄養価（原物中） DM (%)	TDN (%)	ME (Kcal/kg)	消化率 粗たん白質	粗脂肪	可溶無窒素物	粗繊維	代謝率	備　　考
（略）										
３．植物性油かす類 （植物性油料原料から搾油したかす類又は植物性たん白質を主成分とするものをいう。）										
油ヤシ空果房抽出物	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
加糖加熱処理大豆油かす	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

ひまわり油かす	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
脱殻ひまわり油かす	鶏 豚 牛	― ― 89.6	― ― 64.9	― ― ―	― ― 91	― ― 42	― ― 87	― ― 31	― ― ―	殻を大部分除去したひまわり種子の溶媒抽出後に得られた搾油かすであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)										
5．その他										
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
脂肪酸カルシウム	鶏 (略)	96.5 (略)	― (略)	6,480 (略)	― (略)	― (略)	― (略)	― (略)	82.6 (略)	(略)
脂肪酸カルシウム	鶏 豚 牛	97.7 ― 97.7	― ― 190.4	6,780 ― ―	― ― ―	― ― 100	― ― ―	― ― ―	86.4 ― ―	アマニ油の脂肪酸を80%以上含む脂肪酸であること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
脂肪酸カルシウム	鶏 豚 牛	― ― 97.6	― ― 187.3	― ― ―	― ― ―	― ― 100	― ― ―	― ― ―	― ― ―	パーム油由来の製品であって、オレイン酸を60%以上含むものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
中鎖脂肪酸カルシウム	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
２－デアミノ－２－ヒドロキシメチオニン	鶏 豚 牛	89.1 89.1 89.1	― 89.1 89.1	3,991 ― ―	― ― ―	― ― ―	100 100 100	― ― ―	79.9 ― ―	飼料添加物であること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

ひまわり油かす	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(略)										
5．その他										
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
脂肪酸カルシウム	鶏 (略)	― (略)	― (略)	― (略)	― (略)	― (略)	― (略)	― (略)	― (略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
中鎖脂肪酸カルシウム	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)